

Carabus Hoppei Sturm war von Dr. Kraatz (Deutsche entomol. Ztschr. 1878) in *C. brevicornis* Kr. umgetauft worden, weil der von Germar 1824 beschriebene *C. Hoppei* nicht mit dem von Dr. Hoppe bei Heiligenblut in Kärnthen 1816 aufgefundenen und von Sturm benannten Käfer identisch wäre. In der „Stett. entom. Ztg.“ 1879, 161 remonstrirt Prof. Dr. Doebrner hiergegen unter Anführung der Beschreibung von Sturm und Hagenbach in den Acta nova der kaiserlichen Carolin.-Leopoldinischen Akademie, in der die Germar'sche Beschreibung citirt ist. Herr Prof. Doebrner hat im J. 1834 mit Hoppe zusammen den Käfer bei Heiligenblut gesammelt. Die Kraatz'sche Bezeichnung *brevicornis* wird demnach hinfällig.

Herr A. Müller, Custos am entomologischen Museum in Bern, theilt uns mit, dass seit dem 1. Jan. e. folgende von einander unabhängige Institute unter seiner Leitung stehen (Bern, Junkergasse 195 a):

- I. Die entomologische Abtheilung des Naturhistorischen Museums der Stadt Bern;
- II. die Bibliothek der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft;
- III. Die Bibliothek und Sammlung seiner Entomologischen Station, früher in Basel.

Literarische Revue.

Termézetrajzi Füzetek, Budapest. 1879. (Entomol. Inh.)

I. H. (Jan.-März.) — Frivaldszky Joh., Coleoptera nova ex Hungaria (*Anophthalmus cognatus* Frid., *Scotodiphus brevipennis* Frid., *Oxymus poroellus* Frid. — Kenderesy D. v., *Anophthalmus Budae Kend.*, n. sp. — Moesary A., *Mellifera nova* (*Megachile vicina*, M. *Dacica*, beide aus Ungarn, M. *squamigera*, Syrien, Ägypten *dilecta*, Ung.).

II. H. (April-Juni). — Merkl E., ungarische Fundorte der Kätergattung *Anophthalmus*. — Moesary A., Hymenoptera nova e fauna Hungarica (*Sehironera vittata*, *Emphytus Temesiensis*, *Athalia rufoscutellata*, *A. maculata*, dazu *A. Paveii* aus Kleinasiens, *Allantus Frivaldszkyi*, *Tenthredo gracilenta*, *Lencaspis parvicauda*, *Holopyga similis*, *H. bellipes*, *Chrysis (Tetrachrysis placida)*, *Pompilus luctuosus*, *P. Iaeus*, *P. lateritius*, *Tachytes strigosus*, *Dryndella modesta*, *Dr. lineata*, *A. festivum*, *Cerceris penicillata*, *Cere. cibrata*, *Hoplisus anceps*, *H. nigro-facies*, *H. minutus*, *Oxybelus elegans*, *O. meridionalis*. — Horvath Dr. G., Hemiptera-Heteroptera a dom. Joanne Xantus in China et in Japania collecta, cum tabula. —

Fauvel A., Annuaire entomologique pour 1879. Caen, chez l'auteur
rue d'Auge 16. Paris, chez L. Buquet, rue St. Placide 52.

Das Verzeichniss der französischen Coleopterologen, einschliesslich der elsass-lothringischen, (der Verfasser riskirt offenbar nicht, seinen Landsleuten als Thatsache vorzuführen, dass Elsass-Lothringen jetzt deutsches Gebiet ist,) und derjenigen aus Algier nimmt die Seiten 17 bis 49 ein, derjenigen aus Belgien, Holland, der Provinces rhénanes (das deutsche Wort Rheinprovinz würde den dem Verfasser eigenthümlichen geographischen Begriff nicht wiedergeben, Wetzlar, Nassau, Arolsen, Cassel etc. liegen z. B. auch noch in diesen Prov. rhénanes) und der französischen Schweiz, in welche auch theilweise die deutsche eingreift, von 50—58. Dann folgen Sociétés et Revues d'Entomologie, 59—63. — Bibliographie (sehr beschränkt), 64—66. — Espèces nouvelles de la faune gallo-rhénane, 67—71. — Synonymies, 72—75. — Espèces critiques, 76. — Des faunes locales, lettres à M. de Borre, 77—87. — Captures nouvelles, excursions, 88—95. — Moeurs des espèces, 96—107. — Méthodes de chasse, préparation et conservation des collections, 108—115. — Necrologie, 116—19. — Echanges, 120—25. — Faits, avis et annonces diverses, 126—7. — Ouvrages de l'auteur, 128—31. — Mesures, monnaies, tarifs postaux, 132—5. Voran geht ein kurzes Kalendarium.

Stettiner entomologische Zeitung, 1879, 1—6.

Tischbein, Zusätze und Bemerkungen zu der Uebersicht der europäischen Arten des Genus Ichneumon, 20—40. Enthält folgende neue Arten: Ichneumon guttatus ♀; percussor ♂; coeruleoescens ♀; limbatus ♂; brunnipes ♂; piceatus ♀; intermixtus ♀; finitimus ♀; examinator ♀; affectus ♀; alius ♀; flaviceps ♂; albiornatus ♂; (Ichneumon oder Amblyteles (?)) infinitus ♂; J. pulcher ♀; albus ♂; Amblyteles trifasciatus ♀; var. 1; aequivocus ♂ u. 4 var.; rufoniger ♂; proximus ♂; alternator ♀; aterrimus ♂; impressus ♂; subfasciatus ♂; interiectus ♀ und 2 var.; filatus ♀. Ichneumon explorator Tischb. wird als J. consimilis Wesm. erklärt; J. melanobatus muss statt in die Subdiv. 2 Holmgr. in die Subdiv. 1 gestellt werden; desgl. J. tuberculipes ♀ Wesm., von dem J. cuneatus ♀ Tischb. eine Varietät ist. — Fuchs A., lepidopterologische Mittheilungen aus dem nassauischen Rheinthale, 40—46. (Pell. Calabria, Botys trinalis, Euzophera rhenanella Fuchs = tephriella Led. — Hopffer C., exotische Schmetterlinge, I, 47—95 (Revision, Literatur- und Vaterlandsangabe, neue Arten). — Nekrolog (Stal), 97—105, von J. Spangberg. — Karsch F., 7 neue Arachniden von St. Martha, 106—109. — Schmidt W., über Panthea Coenobita Esp., 109. — Dohrn C. A., Sahlberg's Insecta Fennica besprochen, II, 110—112. — Maassen, P., Bemerkungen über Urania Ripheus, 113—115. — Osten-Sacken C. R., über einige Fälle von copula inter

mares bei Insecten, 116—118. — Dohrn C. A., extra muros, 119—131. — Snellen van Vollenhoven, einige neue Arten von Pimplarien aus Ost-Indien, 133—150. — Speyer A., lepidopterologische Notizen, 151—55; 1. über Linné's Phalaena pavonia maior und minor; 2. Uebersetzersünden; 3. die Flügelhaltung der Hesperiden. — Eichhoff W., ein für Deutschland neuer Geotrupes (pyrenaeus Charp., gefunden in den Vogesen), 156—57. — Pflümer Chr. Fr., ein Beitrag zur Schmetterlingskunde (Argynnus Aglaia ab. Eridioides; Callimorpha Dominula ab. Hamelensis; Cidaria Blomeri Cust.; Miselia Oxyacanthae), 157—61. — Doeblner, ein Wort gegen die Vermehrung des Ballastes der Synonymie, 161—62. — Dohrn C. A., esoterische Plauderei, 163—65. — Fuchs A., lepidopterologische Mittheilungen aus dem nassauischen Rheinthalе Forts., 166—74. (Lithosia lutarella L., Aretia villaea L., Cloantha Hyperici F., Naturgeschichte von Cidaria miata L.) — Ploetz C., Hesperiina H. Sch., 175—80. — Lichtenstein J., die Wanderungen der Blattläuse, 181—82. — Keferstein A., entomologische Notizen, 183 bis 84. — Dohrn C. A., Exotisches (Coleopt.), 184—89. — Burmeister H., briefliche Mittheilungen, 194—209. — Weymier G., Notiz zu dem Artikel „Exotische Schmetterlinge“ von C. Hopffer, 209—10. — Rupertsberger M., Catalog der bekannten europäischen Käferlarven, 211—36. Leider ohne Angabe der Literatur. — Harold E. v., Nomenclatorisches, 237—246. — Möschler H. B., Nordamerikanisches (Lepidopt.), 246. — Dohrn C. A., Exotisches (Coleopt.), 247—8. — Haag-Rutenberg, Beiträge zur Kenntniss der Canthariden, 1. Tetraonyx, 249—75. — Hoyningen-Huene Baron F., die estländischen Formen der Oeneis Junta, 276—8. — Möschler H. B., Nordamerikanisches. Besprechung von „Butterflies and Moths of North America, a complete synonymous Catalogue of Macrolepidoptera. Diurnes by H. Strecker 1878“, 280—83.

Tauschverkehr und Kaufgesuche.

Habe abzugeben eine grössere Anzahl von Att. Pernyi, I. und II. Generation, gegen europäische Macrolepidopteren; die Thiere sind alle dieses Jahr gezogen und gut gespannt.

Chodau b. Karlsbad, Böhmen.

Ernst Louis Frosch, Maler.

Nachstehende Insekten, als: Botys frumentalis, Graphot. botrana, conterminana, Carpocapsa funebrana, Oecophora Roesella, Gelech. nancella, Laverna Hellerella, dann Psylla mali, Typhlocyta Rose, Calocoris bipunctata, Orthotylus nassatus, wünscht zu kaufen

M. Dr. Prof. Schmidt-Göbel,
Baden b. Wien, Jägerhausgasse 15.